





# Técnicas de reparación en pseudoaneurismas.

La rotura incompleta del corazón se produce cuando trombos y hematomas en organización, (junto con tejido pericárdico), sellan una rotura en el ventrículo izquierdo. Con el tiempo, esta área de trombo organizado y pericardio puede convertirse en lo que conocemos como *pseudoaneurisma*, careciendo así de elementos de la pared miocárdica original.




Presentamos nuestra experiencia en técnicas de reparación quirúrgica de pseudoaneurismas de ventrículo izquierdo, en pacientes que lo han desarrollado como complicación tras un infarto agudo de miocardio.



De cara a la intervención, se practica una aneurismorrafia ventricular con puntos de prolene, y bandeleta de telfon, lográndose así estrechar la solución de continuidad en el ápex ventricular, y consiguiéndose una adecuada estanqueidad de la sutura.

Resultados en el postoperatorio: Recuperación satisfactoria, con adecuada función ventricular izquierda residual.

**Conclusiones:** Los pseudoaneurismas ventriculares, son complicaciones poco frecuentes pero muy complejas, tanto en su pronóstico, como a nivel quirúrgico. Una adecuada técnica permitirá preservar una aceptable función sistólica postquirúrgica, tras su reparación, así como evitar el riesgo de una ruptura y sangrado.



**Autores:** Iorlano M, Piercarmine, Contreras, M., Piedra, C., Siliato, M., Resta, P., Palmer, N., Ríos, R., Moradi, M., Castro, M., Sureda, J., Rodríguez, Rafael.

**Servicio de Cirugía Cardíaca - Hospital Universitario Vall d'Hebron**